



Стандарт безопасной деятельности СПб ГБУЗ «Кожно-венерологический диспансер № 8», в том числе санитарно-гигиенической безопасности в целях противодействия распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

1. Общие положения

1.1. Настоящая форма Стандарта безопасной деятельности СПб ГБУЗ «Кожно-венерологический диспансер № 8», в том числе санитарно-гигиенической безопасности в целях противодействия распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее – Стандарт) содержит основные требования, предъявляемые к санитарному режиму и личной гигиене работников, особенностям режимов доступа, санитарной обработке помещений, обеспечению работников средствами защиты и другие необходимые мероприятия для противодействия распространения в Санкт-Петербурге коронавирусной инфекции (COVID-19).

1.2. Стандарт включает требования по организации работы СПб ГБУЗ «КВД № 8», оказывающего первичную медико-санитарную и первичную специализированную медицинскую помощь в амбулаторных условиях.

1.3. Общие рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) размещены на официальной странице сайта Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (далее - Роспотребнадзор) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Санитарно-гигиенические требования и порядок допуска работников

2.1. Обеспечить принятие локальных нормативных актов, устанавливающих:

- численность и перечень работников, непосредственно участвующих в оказании медицинских услуг, которые необходимы для непрерывного обеспечения функционирования организации и не подлежащих переводу на дистанционный режим работы;

- численность и перечень работников, в отношении которых в соответствии с Постановлением Губернатора СПб установлен режим самоизоляции (лица, старше 65 лет), обоснование о необходимости присутствия их на рабочих местах в связи непрерывным обеспечением первичной медико-санитарной помощи населению района;

- получение уникального QR-кода по месту осуществления деятельности, подтверждающего готовность выполнения Стандарта безопасной деятельности.

2.2. Организовать системную работу по информированию медицинских работников о рисках новой коронавирусной инфекции COVID-19, мерах индивидуальной профилактики, необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых симптомов ОРВИ и подготовку их по актуальным вопросам новой

коронавирусной инфекции путем освоения информационных материалов и интерактивных образовательных модулей, которые размещены на Портале непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России с прохождением тестирования.

2.3. Для работников, на основании существующих документов, разработать правила личной гигиены, включая требования по применению одежды, регламенту уборки и дезинфекции.

2.4. Обеспечить подготовку и переподготовку работников по правилам личной гигиены и технике безопасности.

2.5. Перед началом рабочего дня организовать ежедневный визуальный осмотр и опрос работников на предмет наличия симптомов ОРВИ.

2.6. Обеспечить измерение температуры работников перед началом работы (при температуре 37.0 и выше, либо при других явных признаках ОРВИ, сотрудник должен быть отстранен от работы). Каждое измерение температуры регистрировать в журнале регистрации температуры работников.

2.7. Каждый работник должен оповещать о любых отклонениях в состоянии здоровья. Не допускать работника с симптомами заболевания до работы и уведомить его о необходимости обращения в медицинское учреждение. Возобновление допуска к работе проводить только при наличии справки лечебного учреждения о выздоровлении и отрицательного результата анализа на (COVID-19).

2.8 Обеспечить работников запасом одноразовых масок (смена масок не реже одного раза в 3 часа), для использования их при работе, а также кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами. Повторное использование масок одноразовых, а также использование увлажненных масок не допускается.

2.9. Предусмотреть наличие запаса необходимых расходных материалов, средств индивидуальной защиты (очки, щитки, маски, шапочки, одноразовые перчатки) и дезинфекционных средств в объеме не менее расчетной потребности на 3 месяца работы.

2.10. Работники обязаны выполнять правила личной гигиены и производственной санитарии. Обработку рук производить в специально предназначенных местах оборудованных смесителями, дозаторами с жидким мылом и растворами антисептиков или на рабочих местах с применением средств индивидуальной обработки.

2.11. Для механического удаления загрязнений и микрофлоры руки мыть теплой проточной водой с мылом в течение 1-2 минут, обращая внимание на оклоногтевые пространства. Использовать сорта мыла с высокой пенобразующей способностью. Затем руки ополаскивать водой для удаления мыла и обработать дезинфицирующими средствами.

3. Санитарная обработка помещений

3.1. Профилактическую дезинфекцию проводить на системной основе, которая включает в себя меры личной гигиены – частое мытье рук с мылом или обработку их кожными антисептиками, проветривание и обеззараживание воздуха, проведение влажной уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств.

3.2. Регулярно (каждые 2 часа) проветривать рабочие помещения, обеспечить оборудованием для обеззараживания воздуха помещений, где могут одновременно находиться несколько лиц (холлы, регистратура, коридоры, конференц-зал, приемная главного врача и другие).

3.3. Дезинфекцию проводить собственными силами. Обеззараживанию подлежат все поверхности, оборудование и инвентарь кабинетов, санузлов. При обработке поверхностей применять способ орошения. Воздух обрабатывать с использованием закрытых ультрафиолетовых облучателей.

3.4. Перед началом работы проводить влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств. Не рекомендуется сухая уборка помещений.

3.5. Уборку помещений проводить не реже одного раза в смену с использованием дезинфицирующих средств.

3.6. Увеличить кратность дезинфекционных обработок помещений, а именно, организовать в течение рабочего дня обработку помещений дезинфицирующими средствами, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, перил, поручней, контактных поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники), мест общего пользования (входные группы, санузлы), с кратностью обработки не реже одного раза в четыре часа.

3.7. Перед входом в учреждение должен лежать резиновый коврик, смоченный дезинфицирующим средством. Очистка его должна производиться по мере необходимости, но не реже 1 раза в день.

3.8 Обработку поверхностей проводить способом протирания ветошью, смоченной дезинфицирующим раствором или способом орошения путем распыления дезинфицирующего раствора, с последующим проветриванием до исчезновения запаха дезинфектанта.

3.9. Для дезинфекции использовать средства из различных химических групп: хлорактивные (анолит АНК СУПЕР — в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 0,05%, катионные поверхностно-активные вещества (КПАВ) — четвертичные аммониевые соединения («Петролайт» в концентрации в рабочем растворе не менее 4%), спирты (в качестве кожных антисептиков и дезинфицирующих средств (АХДЕЗ, Амифлайн для обработки небольших по площади поверхностей — изопропиловый спирт в концентрации не менее 70% по массе, этиловый спирт в концентрации не менее 70% по массе). Содержание действующих веществ указано в инструкциях по применению. Проводить контроль концентрации анолита в рабочих растворах.

3.10. Воздух, в присутствии работников, обрабатывать с использованием технологий и оборудования, разрешенных к применению в установленном порядке, на основе использования ультрафиолетового излучения (рециркуляторов), различных видов фильтров (в том числе электрофильтров) в соответствии с действующими методическими документами.

3.11. Воздух обрабатывать с использованием бактерицидных облучателей для обеззараживания воздуха и (или) поверхностей.

3.12. Все виды работ с дезинфицирующими средствами выполнять во одноразовых перчатках влагонепроницаемых или многократного применения. При проведении заключительной дезинфекции способом орошения использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ). Органы дыхания защищать респиратором, глаза — защитными очками.

3.13. По окончании рабочей смены (или не реже чем через 6 часов), проводить проветривание и влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств путем протирания дезинфицирующими салфетками (или растворами дезинфицирующих средств) ручек дверей, поручней, столов, спинок стульев (подлокотников кресел).

3.14. Для уничтожения микроорганизмов соблюдать время экспозиции и концентрацию рабочего раствора дезинфицирующего средства в соответствии с инструкцией. При необходимости, после обработки поверхность промывать водой и высушивать с помощью бумажных полотенец.

3.15. Отходы производства и мусор собирать в специальные контейнеры с приводной крышкой с удалением из помещения не реже одного раза в смену. Раковины для мытья рук, санитарные узлы и контейнеры для мусора мыть и дезинфицировать ежедневно.

3.16. Дезинфицирующие средства хранить в упаковках изготовителя, плотно закрытыми в специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте, недоступном для детей.

3.17. Всю входящую корреспонденцию обрабатывать подходящими для этого дезинфицирующими средствами.

4. Алгоритм действий в случае подозрения заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19

4.1. Работник, у которого имеются подозрения заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19, с использованием имеющихся средств связи, должен известить руководителя организации о своем состоянии.

4.2. При появлении подозрения заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19, вызвать специализированную выездную бригаду скорой медицинской помощи.

4.3. Использовать бактерицидные облучатели для обеззараживания воздуха и (или) поверхностей для дезинфекции воздушной среды помещения (при наличии).

4.4. При подтверждении у работника заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 сформировать сведения о контактах работника в рамках исполнения служебных обязанностей за последние 14 дней и уведомить всех работников, входящих в данный список, о необходимости соблюдения режима самоизоляции.

5. Прочие мероприятия, необходимые для обеспечения санитарно-гигиенической безопасности

5.1. Все работы в организации проводить согласно сменному графику работы с целью уменьшения большого скопления при входе и выходе работников. Соблюдать социальное дистанцирование 1,5 метра.

5.2. Обеспечить расстояние между врачом и пациентом не менее 1,5 метров.

5.3. Обеспечить возможность допуска в границах выделенной зоны работников иных организаций, обеспечивающих выгрузку и погрузку товаров, сырья и материалов, которые необходимы для обеспечения функционирования организации.